

감염병 예방 및 유의사항

배곧새봄 학부모님 안녕하십니까?

신학기가 시작됨에 따라 유아들 사이에 각종 감염병이 발생할 가능성이 있습니다. 유아의 건강한 유치원 생활을 위한 예방수칙 및 감염병 확산 대처방안을 다음과 같이 알려드리며, 본원에서도 항상 유아의 건강과 안전을 위해 노력하겠습니다. 학부모님들의 많은 관심과 협조 부탁드립니다.

1. 감염병 의심·확진시 전파 방지를 위한 협조사항 ☆☆☆중요해요!

- ✓ 감염병 의심증상(발진, 발열 등)이 있을 경우, 빠른 시간 내에 의사의 진단을 받도록 합니다.
[의사의 진단을 받은 후 유치원에 등원]
- ✓ 감염병 확진(의심)의 진단을 받은 경우, 유치원에 바로 연락하고 유아는 집에서 휴식을 취합니다.
- ✓ 감염병 진단으로 등원중지하였다가 다시 등원을 하는 경우, **전염력 소실에 대한 의사의 소견서, 진료확인서, 진단서 중 1부를 제출**하셔야 합니다. **[※완치 후 등원하는 날 반드시 지참, 출석 인정]**
- ✓ 형제·자매간 한 명이 감염병 진단 시, 유치원 단체생활을 고려하여 감염병 확산 방지를 위해 가정교육에 협조 부탁드립니다.

2. 등원중지 감염병 질환

가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 규정된 감염병 환자

나. 위의 항목 이외의 환자로 건강검사 결과나 의사의 진단 결과 감염병에 감염되었거나 감염된 것으로 의심되거나 감염될 우려가 있는 경우(예.코로나바이러스감염증-19, 무균성 뇌수막염 등)

병명	전파경로	잠복기	전염가능기간	임상증상
			★ 등원중지기간 ★	
수두	비말 에어로졸	10-21일 (평균 14-16일)	수포가 생기기 1-2일 전부터 모든 수포에 딱지가 형성될 때까지	피부발진, 수포, 발열, 피로감
유행성 이하선염	비말	14-25일 (평균 14-18일)	증상 발현 후 9일까지	이하선 부종, 발열, 두통, 근육통
홍역	비말 에어로졸	7-21일 (평균 10-21일)	발진 발생 4일 전부터 발진 발생 5일 후까지	발진, 발열, 기침, 콧물, koplick 반점
인플루엔 자	비말	1-4일 (평균 2일)	치료를 위한 휴식권장	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침, 객담
수족구병	비말 수포액	3-7일	피부병변(수포)에 딱지가 생성될 때까지 (수포 발생 후 6일 정도)	발열, 손·발바닥 및 구강 내 수포 및 궤양
유행성 각결막염	환자와 접촉	5-7일	증상이 사라진 후 2일이 경과할 때까지	충혈, 안통, 이물감, 눈부심, 많은 눈물 및 눈곱, 결막 하출혈
노로 바이러스	분변 구강	24-48시간 (평균 33시간)	치료 완료 시까지	오심, 구토, 설사, 복통, 권태감, 발열

※ 등원중지 여부 및 기간은 의사의 소견을 따릅니다.


3. 단체 생활 감염병 예방수칙

첫째, 비누를 사용하여 30초 이상 손을 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절을 지켜주세요.

둘째, 감염병 의심증상이 발생한 경우, 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에 방문하여 진료를 받으세요.

셋째, 집단유행을 막기 위해 감염환자는 전염기간(등교중지기간) 동안에는 등원(학원 등 사람이 많은 장소 포함)을 하지 않도록 하세요.

4. 올바른 손 씻기 및 기침예절 지키기



🔗 안전 교육자료 링크(클릭! 클릭!)

♥ 까투리와 함께하는 감염병 예방 수칙 <https://www.youtube.com/watch?v=mYTWsUzIwD0>

2020. 4. 24.

배곧새봄유치원장